

TD – EXERCICES

TD 6

Limites de fonctions

Sommaire du TD

I	Limites usuelles, asymptotes et formes indéterminées	2
II	Composition, comparaison et encadrement	14
III	Fonction exponentielle et croissances comparées	17
IV	Extraits du Bac	24

Thème I

Limites usuelles, asymptotes et formes indéterminées



Rappel – asymptotes

- Si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, alors la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe de f .
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, alors la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale à la courbe de f .

Exercice 1 Lire des asymptotes dans un tableau de variations

On donne le tableau de variations d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$. Déterminer les équations des asymptotes.

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$
Variations de f	3		$+\infty$	10
		0	$-\infty$	



Corrigé

D'après le tableau :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} f(x) = +\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10.$$

Ainsi, la courbe de f admet :

- une asymptote horizontale d'équation $y = 3$ en $-\infty$;
- une asymptote verticale d'équation $x = 5$;
- une asymptote horizontale d'équation $y = 10$ en $+\infty$.

Exercice 2 Calculer des limites classiques et déterminer les asymptotes

Dans cet exercice, on précisera les éventuelles asymptotes aux courbes représentatives.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ par

$$f(x) = \frac{6-x}{x-5}.$$

Étudier les limites de f en 5 à gauche et à droite, en $+\infty$ et en $-\infty$.



Corrigé

Au voisinage de 5, le numérateur tend vers $1 > 0$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 5} (6 - x) = 1 > 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} (x - 5) = 0^- \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} f(x) = -\infty}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 5} (6 - x) = 1 > 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} (x - 5) = 0^+ \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} f(x) = +\infty}$$

Donc $x = 5$ est une asymptote verticale.

Pour $x \neq 5$:

$$f(x) = \frac{-1 + \frac{6}{x}}{1 - \frac{5}{x}}.$$

Ainsi, aussi bien en $+\infty$ qu'en $-\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-1 + \frac{6}{x}\right) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{5}{x}\right) = 1 \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1}$$

Donc $y = -1$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Soit g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$g(x) = x^2 - x + \frac{1}{x-1}.$$

Étudier les limites de g en 1 à gauche et à droite, en $+\infty$ et en $-\infty$.



Corrigé

On a $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x) = 0$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (x - 1) = 0^- \quad \xRightarrow{\text{par inverse}} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{x - 1} = -\infty.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} g(x) = -\infty}.$$

De même :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x - 1) = 0^+ \quad \xRightarrow{\text{par inverse}} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{x - 1} = +\infty,$$

d'où

$$\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} g(x) = +\infty}.$$

Ainsi, $x = 1$ est une asymptote verticale.

Pour les limites à l'infini :

$$x^2 - x = x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right).$$

Alors :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 > 0 \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par produit}} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - x) = +\infty.$$

Par ailleurs,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty}.$$

Il n'y a pas d'asymptote horizontale.

3. Soit h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$h(x) = \frac{2x+1}{(x-1)^2}.$$

Étudier les limites de h en 1 à gauche et à droite, en $+\infty$ et en $-\infty$.



Corrigé

Au voisinage de 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x+1) = 3 > 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0^+.$$

Ainsi, des deux côtés :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = +\infty}.$$

La droite $x = 1$ est donc une asymptote verticale.

Pour $x \neq 0$:

$$h(x) = \frac{x \left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2}.$$

En $+\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{par quotient} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0}.$$

En $-\infty$, le dénominateur tend vers $-\infty$, donc de même :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0}.$$

La droite $y = 0$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.

4. Soit k définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ par

$$k(x) = \frac{x-2}{x^2-3x+2}.$$

Étudier les limites de k en 1 à gauche et à droite, en $+\infty$ et en $-\infty$.



Corrigé

On factorise le dénominateur :

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2).$$

Ainsi, pour tout $x \in D_k$:

$$k(x) = \frac{x-2}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-1}.$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (x-1) = 0^- &\quad \xRightarrow{\text{par inverse}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} k(x) = -\infty}, \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x-1) = 0^+ &\quad \xRightarrow{\text{par inverse}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} k(x) = +\infty}. \end{aligned}$$

Donc $x = 1$ est une asymptote verticale.

Enfin :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x-1) = \pm\infty \underset{\text{par inverse}}{\implies} \boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 0}.$$

La droite $y = 0$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.

Remarque : en $x = 2$, l'expression initiale n'est pas définie mais, après simplification,

$$\lim_{x \rightarrow 2} k(x) = 1.$$

Il ne s'agit donc pas d'une asymptote verticale en 2.

Exercice 3 Lever une forme indéterminée $\frac{0}{0}$ par factorisation



Méthode

Quand une fraction rationnelle conduit à la forme indéterminée $\frac{0}{0}$ en a , on cherche à factoriser le numérateur et le dénominateur par $(x - a)$, puis on simplifie avant de reprendre le calcul de la limite.

1. Soit f définie sur D_f par

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2-3x+2}.$$

1. a. Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .



Corrigé

Le dénominateur s'annule lorsque

$$x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Or :

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2).$$

Ainsi :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}.$$

1. b. Étudier la limite de f en 1.



Aide

Factoriser $x^2 - 3x + 2$ puis simplifier l'expression de f .



Corrigé

Avec l'expression initiale :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 2) = 0 \end{cases}$$

on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Pour tout $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} \\ &= \frac{1}{x-2}. \end{aligned}$$

D'où :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{1-2} = -1.$$

1. c. Étudier les limites de f aux autres bornes de son ensemble de définition.



Corrigé

Pour tout $x \in D_f$:

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty \xRightarrow{\text{par inverse}} \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0},$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2) = -\infty \xRightarrow{\text{par inverse}} \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0}.$$

Donc $y = 0$ est une asymptote horizontale aux deux infinis.

Au voisinage de 2 :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} (x - 2) = 0^- \xRightarrow{\text{par inverse}} \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = -\infty},$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x - 2) = 0^+ \xRightarrow{\text{par inverse}} \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = +\infty}.$$

Donc $x = 2$ est une asymptote verticale.

2. Soit g définie sur D_g par

$$g(x) = \frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 8x + 15}.$$

2. a. Déterminer D_g , l'ensemble de définition de g .



Corrigé

On factorise le dénominateur :

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5).$$

Il s'annule pour $x = 3$ et $x = 5$. Ainsi :

$$\boxed{D_g = \mathbb{R} \setminus \{3 ; 5\}}.$$

2. b. Étudier la limite de g en 3.



Aide

Factoriser le numérateur et le dénominateur puis simplifier l'expression de g .



Corrigé

Avec l'expression initiale, le numérateur et le dénominateur tendent vers 0 : on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

On factorise :

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

et

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5).$$

Ainsi, pour tout $x \in D_g$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(x - 3)(x - 4)}{(x - 3)(x - 5)} \\ &= \frac{x - 4}{x - 5}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \frac{3 - 4}{3 - 5} = \frac{1}{2}}.$$

2. c. Étudier les limites de g aux autres bornes de son ensemble de définition.

**Corrigé**

Pour tout $x \in D_g$:

$$g(x) = \frac{x-4}{x-5}.$$

Pour $x \neq 0$:

$$g(x) = \frac{1 - \frac{4}{x}}{1 - \frac{5}{x}}.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{4}{x}\right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{5}{x}\right) = 1 \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 1}.$$

La droite $y = 1$ est une asymptote horizontale aux deux infinis.

Au voisinage de 5, le numérateur tend vers $1 > 0$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 5} (x-4) = 1 > 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} (x-5) = 0^- \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} g(x) = -\infty},$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 5} (x-4) = 1 > 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} (x-5) = 0^+ \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x > 5}} g(x) = +\infty}.$$

Donc $x = 5$ est une asymptote verticale.

Exercice 4 Lever une forme indéterminée $\frac{0}{0}$ en transformant l'expression

**Méthode**

On cherche une transformation adaptée : factorisation remarquable, identité algébrique ou quantité conjuguée. L'objectif est de faire apparaître puis de simplifier le facteur responsable de la forme $\frac{0}{0}$.

1. 1. a. Montrer que, pour tout réel $x \neq 1$,

$$1 + x + x^2 + x^3 = \frac{x^4 - 1}{x - 1}.$$

**Corrigé**

On développe :

$$\begin{aligned} (x-1)(1+x+x^2+x^3) &= x+x^2+x^3+x^4 - (1+x+x^2+x^3) \\ &= x^4 - 1. \end{aligned}$$

Pour $x \neq 1$, on peut diviser par $x-1$:

$$\boxed{1 + x + x^2 + x^3 = \frac{x^4 - 1}{x - 1}}.$$

1. b. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 3x + 2}.$$

**Corrigé**

L'expression conduit à la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Or :

$$x^4 - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2 + x^3)$$

et

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2).$$

Pour $x \neq 1$:

$$\frac{x^4 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1 + x + x^2 + x^3}{x - 2}.$$

Par conséquent :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1 + 1 + 1 + 1}{1 - 2} = -4$$

2. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4}.$$

**Corrigé**

L'expression conduit à la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

On écrit :

$$x - 2\sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)$$

et

$$x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2).$$

Ainsi, pour $x \neq 4$ et $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4} &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4} = \frac{2}{2 + 2} = \frac{1}{2}.$$

Exercice 5 Reconnaître un nombre dérivé



Méthode

Lorsque x tend vers a et qu'une expression contient $f(x) - f(a)$ et $x - a$, penser au taux d'accroissement :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Soit f et g deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et soit a un réel. On suppose que $g'(a) \neq 0$.

1. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}.$$



Aide

Poser $h(x) = xf(a) - af(x)$ et calculer $h(a)$.



Corrigé

Posons

$$h(x) = xf(a) - af(x).$$

Alors :

$$h(a) = af(a) - af(a) = 0.$$

Par conséquent :

$$\frac{xf(a) - af(x)}{x - a} = \frac{h(x) - h(a)}{x - a}.$$

Comme h est dérivable en a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} = h'(a).$$

Or :

$$h'(x) = f(a) - af'(x),$$

donc

$$h'(a) = f(a) - af'(a).$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a} = f(a) - af'(a).$$

2. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}.$$



Corrigé

Pour $x \neq a$, on écrit :

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a) \neq 0.$$

Par quotient de limites :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Exercice 6 Lever une indétermination avec la quantité conjuguée



Méthode

Lorsqu'une expression contient une racine carrée et conduit à une forme indéterminée, penser à multiplier par la quantité conjuguée afin de faire apparaître une identité remarquable.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 5}.$$

1. a. Déterminer la limite de f en $+\infty$.



Corrigé

On a :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5} = +\infty \end{cases} \quad \begin{matrix} \Rightarrow \\ \text{par somme} \end{matrix} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}.$$

1. b. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f(x) = \frac{5}{\sqrt{x^2 + 5} - x}.$$



Corrigé

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} x + \sqrt{x^2 + 5} &= \frac{(x + \sqrt{x^2 + 5})(\sqrt{x^2 + 5} - x)}{\sqrt{x^2 + 5} - x} \\ &= \frac{x^2 + 5 - x^2}{\sqrt{x^2 + 5} - x} \\ &= \boxed{\frac{5}{\sqrt{x^2 + 5} - x}} \end{aligned}$$

1. c. Déterminer la limite de f en $-\infty$.



Corrigé

On utilise l'expression obtenue précédemment :

$$f(x) = \frac{5}{\sqrt{x^2 + 5} - x}.$$

Quand $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 5) = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 5} = +\infty.$$

De plus, $-x \rightarrow +\infty$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 5} - x) = +\infty.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.}$$

2. Soit f définie sur $]0 ; +\infty[$ par

$$f(h) = \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}.$$

Démontrer que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} f(h) = \frac{1}{4}.$$



Corrigé

Avec l'expression initiale, on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} f(h) &= \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} \times \frac{\sqrt{4+h} + 2}{\sqrt{4+h} + 2} \\ &= \frac{4+h-4}{h(\sqrt{4+h}+2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4+h}+2}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0^+} f(h) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}.$$

Exercice 7 Traiter une valeur absolue



Méthode

Pour calculer une limite contenant $|x|$, distinguer les zones où x est positif ou négatif :

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0, \quad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

Soit f définie sur son ensemble de définition par

$$f(x) = \frac{3x + |x|}{7x - 5|x|}.$$

Déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$;
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$;
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$;
4. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$;
5. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.



Corrigé

Pour $x > 0$, on a $|x| = x$. Ainsi :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3x + x}{7x - 5x} \\ &= \frac{4x}{2x} \\ &= 2. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2}.$$

Pour $x < 0$, on a $|x| = -x$. Ainsi :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3x - x}{7x + 5x} \\ &= \frac{2x}{12x} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{6}} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{1}{6}}.$$

Comme

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{1}{6} \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x),$$

la fonction f n'admet pas de limite en 0 :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ n'existe pas.}}$$

Thème II

Composition, comparaison et encadrement

Exercice 8 Utiliser une composition de limites



Rappel – fonction exponentielle

$$\boxed{\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty}.$$

1. Déterminer la limite en $+\infty$ de $x \mapsto e^{3x+2}$ en utilisant une composition.



Corrigé

On pose $X = 3x + 2$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 2) = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \end{array} \right. \quad \xRightarrow{\text{par composition}} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x+2} = +\infty}.$$

2. Calculer de la même façon les limites en $+\infty$ des fonctions suivantes :

2. a. $x \mapsto e^{2x-1}$;



Corrigé

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \end{array} \right. \quad \xRightarrow{\text{par composition}} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-1} = +\infty}.$$

2. b. $x \mapsto \frac{5}{e^{5x-3}}$;



Corrigé

On écrit :

$$\frac{5}{e^{5x-3}} = 5e^{-5x+3}.$$

Puis :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-5x + 3) = -\infty \\ \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0 \end{array} \right. \quad \xRightarrow{\text{par composition}} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-5x+3} = 0.$$

Par produit par 5 :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{e^{5x-3}} = 0}.$$

2. c. $x \mapsto e^{-4x-1}$.



Corrigé

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x - 1) = -\infty \\ \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0 \end{array} \right. \quad \xRightarrow{\text{par composition}} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-4x-1} = 0}.$$

Exercice 9 Utiliser un théorème de comparaison



Méthode

Pour montrer qu'une fonction tend vers $+\infty$, on peut la minorer par une fonction qui tend vers $+\infty$. Pour montrer qu'elle tend vers $-\infty$, on peut la majorer par une fonction qui tend vers $-\infty$.

1. Retrouver par comparaison la limite en $+\infty$ de $x \mapsto e^{3x+2}$.



Corrigé

Pour tout $x > 0$:

$$3x + 2 > x.$$

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$e^{3x+2} > e^x.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Ainsi :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x > 0, e^{3x+2} > e^x \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{array} \right. \quad \xRightarrow{\text{par comparaison}} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{3x+2} = +\infty}.$$

2. Déterminer la limite en $+\infty$ des fonctions suivantes par comparaison.

2. a. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.



Corrigé

Pour tout $x \geq 0$:

$$x^2 + 1 \geq x^2.$$

La fonction racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$\sqrt{x^2 + 1} \geq \sqrt{x^2} = x.$$

Or $x \rightarrow +\infty$. Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty}.$$

2. b. $g(x) = x^5 + 10x + 3$.



Corrigé

Pour tout $x \geq 0$:

$$x^5 + 10x + 3 \geq x^5.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty.$$

Par comparaison :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 + 10x + 3) = +\infty}.$$

Exercice 10 Utiliser le théorème des gendarmes

Soit f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}.$$

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$1 \leq 1 + \frac{1}{x} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2.$$



Corrigé

Pour $x > 0$, on a $\frac{1}{x} > 0$, donc :

$$1 \leq 1 + \frac{1}{x}.$$

Par ailleurs :

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) &= \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{1}{x} \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$1 \leq 1 + \frac{1}{x} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2.$$

2. En déduire un encadrement de $f(x)$.



Corrigé

Tous les termes étant positifs, on peut appliquer la fonction racine carrée, croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$1 \leq \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \leq 1 + \frac{1}{x}.$$

Donc :

$$1 \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{x}.$$

3. En déduire la limite de f en $+\infty$.



Corrigé

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1.$$

Comme :

$$1 \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{x},$$

le théorème des gendarmes donne :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

Exercice 11 Comparer avec la partie entière

**Rappel – partie entière**

Pour tout réel x :

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

Ainsi :

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$$

On note $E(x) = \lfloor x \rfloor$.

1. Comparer les fonctions f et g définies par

$$f(x) = x \quad \text{et} \quad g(x) = E(x).$$

**Corrigé**

Par définition de la partie entière :

$$E(x) \leq x < E(x) + 1.$$

La seconde inégalité donne :

$$x - 1 < E(x).$$

Ainsi, pour tout réel x :

$$x - 1 < E(x) \leq x.$$

2. En déduire les limites de g en $+\infty$ puis en $-\infty$.

**Corrigé**

En $+\infty$:

$$x - 1 < E(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

Par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} E(x) = +\infty.$$

En $-\infty$:

$$E(x) \leq x \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$$

Par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} E(x) = -\infty.$$

Thème III**Fonction exponentielle et croissances comparées****Propriété 1** (Limites liées à la fonction exponentielle)

• Limites usuelles.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

• Conséquence du nombre dérivé en 0.

À savoir redémontrer.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

• Croissances comparées.

Pour tout entier naturel n :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \end{cases}$$

Exercice 12**Combiner composition et croissance comparée**

On ne peut utiliser que les limites du rappel ci-dessus.

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$g(x) = \frac{e^{2x}}{x}.$$

1. Déterminer la limite de g en $-\infty$.



Corrigé

On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0.$$

par composition

De plus :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$$

Par quotient :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x}}{x} = 0.}$$

2. 2. a. Vérifier que, pour tout réel $x \neq 0$,

$$g(x) = 2 \frac{e^{2x}}{2x}.$$



Corrigé

Pour tout $x \neq 0$:

$$2 \frac{e^{2x}}{2x} = \frac{e^{2x}}{x} = g(x).$$

Donc :

$$\boxed{g(x) = 2 \frac{e^{2x}}{2x}.$$

2. b. En déduire la limite de g en $+\infty$ en utilisant une composition.



Corrigé

On pose $X = 2x$. Alors :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{2x} = +\infty.$$

par composition

Comme $g(x) = 2 \frac{e^{2x}}{2x}$:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.}$$

3. Sur le même modèle, déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ des fonctions suivantes :

3. a. $f(x) = \frac{e^{4x}}{5x}$;



Corrigé

En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 4x = -\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{4x} = 0,$$

par composition

et $5x \rightarrow -\infty$. Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.}$$

En $+\infty$, on écrit :

$$f(x) = \frac{4}{5} \frac{e^{4x}}{4x}.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty \end{cases} \quad \begin{array}{c} \implies \\ \text{par composition} \end{array} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{4x}}{4x} = +\infty.$$

Comme $\frac{4}{5} > 0$:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.}$$

3. b. $g(x) = \frac{e^{-5x}}{x}$;



Corrigé

En $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-5x) = -\infty \quad \implies \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-5x} = 0.$$

Comme $x \rightarrow +\infty$:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0.}$$

En $-\infty$, on écrit :

$$g(x) = -5 \frac{e^{-5x}}{-5x}.$$

On pose $X = -5x$. Alors $X \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow -\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-5x}}{-5x} = +\infty.$$

Comme $-5 < 0$:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty.}$$

3. c. $h(x) = \frac{e^{x^2}}{x}$;



Corrigé

Pour $x \neq 0$:

$$h(x) = x \frac{e^{x^2}}{x^2}.$$

On pose $X = x^2$. Lorsque $x \rightarrow \pm\infty$, on a $X \rightarrow +\infty$. Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty \end{cases} \quad \begin{array}{c} \implies \\ \text{par composition} \end{array} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{x^2}}{x^2} = +\infty.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty}.$$

3. d. $k(x) = \frac{e^{x^2+1}}{x}$.

**Corrigé**

On utilise :

$$e^{x^2+1} = e \cdot e^{x^2}.$$

Ainsi :

$$k(x) = e \cdot \frac{e^{x^2}}{x}.$$

Comme $e > 0$ et d'après la question précédente :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = +\infty} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = -\infty}.$$

Exercice 13 Utiliser directement les croissances comparées

Déterminer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^2 e^x + x - 1, \quad g(x) = e^{-x} + x^2 - x, \quad h(x) = \frac{e^x - x^{10}}{e^x - x^{100}}.$$

1. Étudier les limites de f .

**Corrigé**

En $+\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par produit}} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^x = +\infty.$$

De plus, $x - 1 \rightarrow +\infty$. Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}.$$

En $-\infty$, la croissance comparée donne :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0}.$$

Or $x - 1 \rightarrow -\infty$. Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty}.$$

2. Étudier les limites de g .

**Corrigé**

En $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

et

$$x^2 - x = x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right) \rightarrow +\infty.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty}.$$

En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty \quad \xRightarrow{\text{par composition}} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty.$$

Par ailleurs, $x^2 - x \rightarrow +\infty$. Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty}.$$

3. Étudier les limites de h .

Corrigé

En $+\infty$, on divise le numérateur et le dénominateur par e^x :

$$h(x) = \frac{1 - \frac{x^{10}}{e^x}}{1 - \frac{x^{100}}{e^x}}.$$

D'après les croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10}}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1.}$$

En $-\infty$, on divise par x^{100} :

$$h(x) = \frac{\frac{e^x}{x^{100}} - \frac{1}{x^{90}}}{\frac{e^x}{x^{100}} - 1}.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x^{100}} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^{90}} = 0.$$

Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0.}$$

Exercice 14 Transformer avant d'utiliser une croissance comparée

Déterminer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ des fonctions

$$f(x) = \frac{1 - 3e^x + e^{2x}}{e^x + 1} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{e^x(x - e^{-x})}{1 - x + e^x}.$$

1. Étudier les limites de f .

Corrigé

En $-\infty$:

$$e^x \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad e^{2x} \rightarrow 0.$$

Par quotient :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{1} = 1.}$$

En $+\infty$, on divise numérateur et dénominateur par e^x :

$$f(x) = \frac{e^{-x} - 3 + e^x}{1 + e^{-x}}.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} - 3 + e^x) = +\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + e^{-x}) = 1 > 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.}$$

2. Étudier les limites de g .

Corrigé

On simplifie d'abord le numérateur :

$$e^x (x - e^{-x}) = x e^x - 1.$$

En $-\infty$, la croissance comparée donne :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Ainsi, le numérateur tend vers -1 . De plus :

$$1 - x + e^x \rightarrow +\infty.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0.}$$

En $+\infty$, on divise numérateur et dénominateur par e^x :

$$g(x) = \frac{x - e^{-x}}{e^{-x} - x e^{-x} + 1}.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^{-x}) = +\infty.$$

D'après les croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0,$$

et $e^{-x} \rightarrow 0$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} - x e^{-x} + 1) = 1 > 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.}$$

Exercice 15 Avec un paramètre : discuter selon les valeurs de k

Soit k un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{k\}$ par

$$f(x) = \frac{e^{-kx}}{k - x}.$$

1. Étudier, selon les valeurs de k , les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Corrigé

Limite en $+\infty$.

- Si $k > 0$, alors $-kx \rightarrow -\infty$, donc $e^{-kx} \rightarrow 0$, tandis que $k - x \rightarrow -\infty$. Ainsi :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.}$$

- Si $k = 0$, alors

$$f(x) = \frac{1}{-x},$$

donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.}$$

- Si $k < 0$, posons $a = -k > 0$. Alors

$$f(x) = \frac{e^{ax}}{-a - x}.$$

Comme $-a - x \sim -x$ et que $\frac{e^{ax}}{x} \rightarrow +\infty$ par croissance comparée, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \geq 0, \\ -\infty & \text{si } k < 0. \end{cases}$$

Limite en $-\infty$.

- Si $k > 0$, alors $-kx \rightarrow +\infty$. En posant $X = -x \rightarrow +\infty$:

$$f(x) = \frac{e^{kX}}{k + X}.$$

La croissance comparée donne :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

- Si $k = 0$, $f(x) = -\frac{1}{x}$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

- Si $k < 0$, alors $-kx \rightarrow -\infty$, donc $e^{-kx} \rightarrow 0$, tandis que $k - x \rightarrow +\infty$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

Finalement :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0, \\ 0 & \text{si } k \leq 0. \end{cases}$$

2. Étudier les limites de f en k^- et en k^+ .



Corrigé

Lorsque $x \rightarrow k$:

$$\lim_{x \rightarrow k} e^{-kx} = e^{-k^2} > 0.$$

Si $x \rightarrow k^-$, alors $k - x \rightarrow 0^+$. Donc :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow k} e^{-kx} = e^{-k^2} > 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow k \\ x < k}} (k - x) = 0^+ \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow k \\ x < k}} f(x) = +\infty}.$$

Si $x \rightarrow k^+$, alors $k - x \rightarrow 0^-$. Donc :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow k} e^{-kx} = e^{-k^2} > 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow k \\ x > k}} (k - x) = 0^- \end{cases} \quad \xRightarrow{\text{par quotient}} \quad \boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow k \\ x > k}} f(x) = -\infty}.$$

La droite $\boxed{x = k}$ est donc une asymptote verticale.

Thème IV

Extraits du Bac

Exercice 16 [BAC] D'après Bac 2020 Polynésie – fonction exponentielle et croissance comparée

Source bac : Bac S 2020 – Polynésie – 2 septembre 2020.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x e^{-x^2+1}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.1. 1. a. Montrer que, pour tout réel $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{e}{x} \times \frac{x^2}{e^{x^2}}.$$



Corrigé

Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x e^{-x^2+1} \\ &= x e e^{-x^2} \\ &= e \frac{x}{e^{x^2}} \\ &= \frac{e}{x} \times \frac{x^2}{e^{x^2}}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$f(x) = \frac{e}{x} \times \frac{x^2}{e^{x^2}} \quad \text{pour } x \neq 0.$$

1. b. En déduire la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Corrigé

On utilise l'écriture précédente :

$$f(x) = \frac{e}{x} \times \frac{x^2}{e^{x^2}}.$$

D'une part :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{x} = 0.$$

D'autre part, on pose $X = x^2$. Alors :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0 \end{cases} \quad \text{par composition} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} = 0.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} = 0 \end{cases} \quad \text{par produit} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

La droite d'équation

$$y = 0$$

est donc une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2. Pour tout réel x , on considère les points M et N de la courbe $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives x et $-x$.

2. a. Montrer que le point O est le milieu du segment $[MN]$.



Corrigé

Les coordonnées des points M et N sont :

$$M(x ; f(x)) \quad \text{et} \quad N(-x ; f(-x)).$$

Or :

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x) e^{-(-x)^2+1} \\ &= -x e^{-x^2+1} \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

Le milieu du segment $[MN]$ a donc pour coordonnées :

$$\left(\frac{x + (-x)}{2} ; \frac{f(x) + f(-x)}{2} \right) = (0 ; 0).$$

Ainsi :

$$\boxed{O \text{ est le milieu du segment } [MN].}$$

2. b. Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}_f$?



Corrigé

Pour tout réel x , les points de la courbe d'abscisses x et $-x$ sont symétriques par rapport à l'origine.
On en déduit que :

$$\boxed{\mathcal{C}_f \text{ admet le point } O \text{ comme centre de symétrie.}}$$

3. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.



Corrigé

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^{-x^2+1} + x \times (-2x) e^{-x^2+1} \\ &= (1 - 2x^2) e^{-x^2+1}. \end{aligned}$$

Pour tout réel x :

$$e^{-x^2+1} > 0.$$

Ainsi, $f'(x)$ est du signe de $1 - 2x^2$.

Sur $[0 ; +\infty[$:

$$\begin{aligned} 1 - 2x^2 = 0 &\iff x^2 = \frac{1}{2} \\ &\iff x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{cases} f'(x) > 0 & \text{si } 0 \leq x < \frac{\sqrt{2}}{2} \\ f'(x) = 0 & \text{si } x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ f'(x) < 0 & \text{si } x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

De plus :

$$f(0) = 0,$$

et

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{1}{2}+1} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} e^{1/2} \\ &= \sqrt{\frac{e}{2}}. \end{aligned}$$

Enfin, d'après la question 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Ainsi, f est croissante sur

$$\left[0 ; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$$

puis décroissante sur

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2} ; +\infty\right[.$$

Son maximum sur $[0 ; +\infty[$ est :

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{\frac{e}{2}}.$$

Exercice 17 [BAC] D'après Bac 2018 Nouvelle-Calédonie – exponentielle, encadrement et variations

Source bac : Bac S 2018 – Nouvelle-Calédonie – février 2018.

Partie A – Étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -2x^3 + x^2 - 1.$$

1. 1. a. Étudier les variations de la fonction g .



Corrigé

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\begin{aligned} g'(x) &= -6x^2 + 2x \\ &= 2x(1 - 3x). \end{aligned}$$

Les deux facteurs s'annulent pour :

$$x = 0 \quad \text{et} \quad x = \frac{1}{3}.$$

On étudie le signe de g' :

- si $x < 0$, alors $2x < 0$ et $1 - 3x > 0$, donc $g'(x) < 0$;
- si $0 < x < \frac{1}{3}$, les deux facteurs sont positifs, donc $g'(x) > 0$;
- si $x > \frac{1}{3}$, alors $2x > 0$ et $1 - 3x < 0$, donc $g'(x) < 0$.

Ainsi, g est décroissante sur $] -\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; \frac{1}{3}]$, puis décroissante sur $[\frac{1}{3} ; +\infty[$.
On calcule :

$$g(0) = -1$$

et

$$\begin{aligned}
 g\left(\frac{1}{3}\right) &= -2 \times \frac{1}{27} + \frac{1}{9} - 1 \\
 &= -\frac{2}{27} + \frac{3}{27} - 1 \\
 &= \frac{1}{27} - 1 \\
 &= -\frac{26}{27}.
 \end{aligned}$$

1. b. Déterminer les limites de la fonction g en $-\infty$ et en $+\infty$.

**Corrigé**

On factorise par le terme dominant x^3 :

$$g(x) = x^3 \left(-2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right).$$

En $+\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right) = -2 < 0 \end{cases} \quad \text{par produit} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty}.$$

En $-\infty$:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} \right) = -2 < 0 \end{cases} \quad \text{par produit} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty}.$$

2. On admet que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$, notée α , et que $\alpha \in [-1 ; 0]$. En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

**Corrigé**

On sait que :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

et que g est décroissante sur $] -\infty ; 0]$. De plus, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [-1 ; 0]$. Ainsi :

$$\begin{cases} g(x) > 0 & \text{si } x < \alpha, \\ g(\alpha) = 0, \\ g(x) < 0 & \text{si } x > \alpha. \end{cases}$$

En effet, les deux extrema locaux calculés précédemment sont négatifs :

$$g(0) = -1 < 0 \quad \text{et} \quad g\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{26}{27} < 0,$$

donc g reste négative après avoir franchi son unique zéro α .

Partie B – Étude de la fonction principale

Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (1 + x + x^2 + x^3) e^{-2x+1}.$$

On note f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

**Corrigé**

On factorise le polynôme par x^3 :

$$1 + x + x^2 + x^3 = x^3 \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 \right).$$

Lorsque $x \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 \right) = 1 > 0.$$

Donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + x + x^2 + x^3) = -\infty}.$$

Par ailleurs :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x + 1) = +\infty \quad \Longrightarrow \quad \text{par composition} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x+1} = +\infty.$$

Le facteur exponentiel est strictement positif. Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + x + x^2 + x^3) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x+1} = +\infty \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \text{par produit} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty}.$$

2. 2. a. Démontrer que, pour tout $x > 1$,

$$1 < x < x^2 < x^3.$$

**Corrigé**

Soit $x > 1$. Comme $x > 0$, on peut multiplier une inégalité par x sans changer son sens.

À partir de $1 < x$:

$$x < x^2.$$

Puis, à partir de $x < x^2$:

$$x^2 < x^3.$$

Ainsi :

$$\boxed{1 < x < x^2 < x^3.}$$

2. b. En déduire que, pour $x > 1$,

$$0 < f(x) < 4x^3 e^{-2x+1}.$$

**Corrigé**

Pour $x > 1$, d'après la question précédente :

$$0 < 1 < x^3, \quad 0 < x < x^3, \quad 0 < x^2 < x^3.$$

En additionnant :

$$0 < 1 + x + x^2 + x^3 < 4x^3.$$

Or :

$$e^{-2x+1} > 0.$$

On peut donc multiplier l'encadrement par ce nombre positif :

$$0 < (1 + x + x^2 + x^3) e^{-2x+1} < 4x^3 e^{-2x+1}.$$

Ainsi :

$$\boxed{0 < f(x) < 4x^3 e^{-2x+1}.$$

2. c. On admet que, pour tout entier naturel n ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0.$$

Vérifier que, pour tout réel x ,

$$4x^3 e^{-2x+1} = \frac{e}{2} (2x)^3 e^{-2x},$$

puis montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^3 e^{-2x+1} = 0.$$



Corrigé

On a :

$$\begin{aligned} \frac{e}{2} (2x)^3 e^{-2x} &= \frac{e}{2} \times 8x^3 e^{-2x} \\ &= 4e x^3 e^{-2x} \\ &= 4x^3 e^{-2x+1}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$4x^3 e^{-2x+1} = \frac{e}{2} (2x)^3 e^{-2x}.$$

On pose $X = 2x$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$. D'après la croissance comparée admise avec $n = 3$:

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} X^3 e^{-X} = 0.$$

Donc :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} X^3 e^{-X} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \implies \\ \text{par composition} \end{matrix} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x)^3 e^{-2x} = 0.$$

En multipliant par la constante $\frac{e}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^3 e^{-2x+1} = 0.$$

2. d. Déterminer la limite de f en $+\infty$ et en donner une interprétation graphique.



Corrigé

Pour tout $x > 1$:

$$0 < f(x) < 4x^3 e^{-2x+1}.$$

Or :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^3 e^{-2x+1} = 0.$$

D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Ainsi, la droite d'équation

$$y = 0$$

est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3. Démontrer que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = (-2x^3 + x^2 - 1) e^{-2x+1}.$$

**Corrigé**

Posons :

$$u(x) = 1 + x + x^2 + x^3 \quad \text{et} \quad v(x) = e^{-2x+1}.$$

Alors :

$$u'(x) = 1 + 2x + 3x^2$$

et

$$v'(x) = -2e^{-2x+1}.$$

Par la formule du produit :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (1 + 2x + 3x^2)e^{-2x+1} - 2(1 + x + x^2 + x^3)e^{-2x+1} \\ &= (1 + 2x + 3x^2 - 2 - 2x - 2x^2 - 2x^3)e^{-2x+1} \\ &= (-2x^3 + x^2 - 1)e^{-2x+1}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\boxed{f'(x) = g(x)e^{-2x+1}.$$

4. À l'aide des résultats de la partie A, déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$.

**Corrigé**

Pour tout réel x :

$$e^{-2x+1} > 0.$$

Donc $f'(x)$ est du signe de $g(x)$.

D'après la partie A :

$$\begin{cases} g(x) > 0 & \text{si } x < \alpha, \\ g(\alpha) = 0, \\ g(x) < 0 & \text{si } x > \alpha. \end{cases}$$

Ainsi :

$$\begin{cases} f'(x) > 0 & \text{si } x < \alpha, \\ f'(\alpha) = 0, \\ f'(x) < 0 & \text{si } x > \alpha. \end{cases}$$

Par conséquent :

$$\boxed{f \text{ est croissante sur }]-\infty ; \alpha] \text{ puis décroissante sur } [\alpha ; +\infty[.}$$

En utilisant les limites précédentes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

La fonction f admet donc un maximum en $x = \alpha$.

Exercice 18 [BAC] D'après Bac 2026 Métropole J2 – croissance comparée et étude d'une fonction

Source bac : Bac Terminale Spécialité Mathématiques 2026 – Métropole, La Réunion, Mayotte – sujet 2, exercice 4. Questions 1 et 2 de la partie consacrée à l'étude de la fonction.

Dans le cadre de la construction d'un logo, on considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par

$$f(x) = (2x - 1)e^{-2x+3}.$$

1. 1. a. Vérifier que, pour tout réel $x \in [0 ; +\infty[$,

$$f(x) = e^2 \times \frac{2x - 1}{e^{2x-1}}.$$



Corrigé

Pour tout réel $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= (2x - 1)e^{-2x+3} \\ &= (2x - 1)e^{2-(2x-1)} \\ &= (2x - 1)e^2 e^{-(2x-1)} \\ &= e^2 \times \frac{2x - 1}{e^{2x-1}}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$f(x) = e^2 \times \frac{2x - 1}{e^{2x-1}}.$$

1. b. En déduire la limite de f en $+\infty$. On pourra poser $X = 2x - 1$.



Corrigé

Posons

$$X = 2x - 1.$$

Lorsque x tend vers $+\infty$:

$$X = 2x - 1 \longrightarrow +\infty.$$

D'après les croissances comparées :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty,$$

donc, par passage à l'inverse :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty \\ \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \implies \\ \text{par composition} \end{matrix} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{e^{2x-1}} = 0.$$

Comme e^2 est une constante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

La droite d'équation

$$y = 0$$

est donc une asymptote horizontale à la courbe représentative de f en $+\infty$.

2. 2. a. Montrer que, pour tout réel $x \in [0 ; +\infty[$,

$$f'(x) = (-4x + 4)e^{-2x+3}.$$

**Corrigé**

On pose

$$u(x) = 2x - 1 \quad \text{et} \quad v(x) = e^{-2x+3}.$$

Alors :

$$u'(x) = 2$$

et, par dérivation d'une fonction composée :

$$v'(x) = -2e^{-2x+3}.$$

Comme $f = uv$, pour tout réel $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2e^{-2x+3} + (2x-1)(-2)e^{-2x+3} \\ &= (2-4x+2)e^{-2x+3} \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = (-4x+4)e^{-2x+3}}$$

2. b. Construire le tableau complet des variations de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$.

**Corrigé**

Pour tout réel $x \geq 0$:

$$e^{-2x+3} > 0.$$

Ainsi, $f'(x)$ est du signe de $-4x+4$.

Or :

$$-4x+4=0 \iff x=1.$$

Donc :

$$\begin{cases} f'(x) > 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ f'(1) = 0, \\ f'(x) < 0 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

On calcule :

$$f(0) = -e^3 \quad \text{et} \quad f(1) = e.$$

D'après la question précédente :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Ainsi, f est strictement croissante sur $[0 ; 1]$, puis strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$, avec un maximum égal à e atteint en $x = 1$.

x	0	1	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variations de f			

Exercice 19 [BAC] D'après Bac 2025 Amérique du Nord J1 – une partie presque complète

Source bac : Bac Terminale Spécialité Mathématiques 2025 – Amérique du Nord – sujet 1, exercice 4, partie C. La dernière question sur les primitives et les aires n'est pas reprise ici.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x^2 + 3x + 2) e^{-x}.$$

1. Démontrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

On admet par ailleurs que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$



Corrigé

Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 3x + 2) e^{-x} \\ &= x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} \right) e^{-x} \\ &= \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} \right) x^2 e^{-x}. \end{aligned}$$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} \right) = 1.$$

D'autre part, d'après les croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} \right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \Rightarrow \\ \text{par produit} \end{matrix} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.}$$

2. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

2. a. Vérifier que, pour tout réel x ,

$$f'(x) = (-x^2 - x + 1) e^{-x}.$$



Corrigé

On pose

$$u(x) = x^2 + 3x + 2 \quad \text{et} \quad v(x) = e^{-x}.$$

Alors :

$$u'(x) = 2x + 3 \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{-x}.$$

Par produit :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x + 3) e^{-x} - (x^2 + 3x + 2) e^{-x} \\ &= (2x + 3 - x^2 - 3x - 2) e^{-x} \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = (-x^2 - x + 1) e^{-x}}$$

2. b. Déterminer le signe de f' sur $\mathbb{R}$, puis en déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

**Corrigé**

Pour tout réel x :

$$e^{-x} > 0.$$

La fonction f' est donc du signe du polynôme

$$P(x) = -x^2 - x + 1.$$

Calculons son discriminant :

$$\begin{aligned}\Delta &= (-1)^2 - 4 \times (-1) \times 1 \\ &= 1 + 4\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta = 5}$$

Les deux racines sont :

$$\alpha = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2},$$

avec $\alpha < \beta$.

Comme le coefficient de x^2 est négatif, P est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur. Ainsi :

$$\begin{cases} f'(x) < 0 & \text{sur }]-\infty ; \alpha[, \\ f'(x) > 0 & \text{sur }]\alpha ; \beta[, \\ f'(x) < 0 & \text{sur }]\beta ; +\infty[. \end{cases}$$

On sait que :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Par conséquent :

- f est décroissante sur $] -\infty ; \alpha]$;
- f est croissante sur $[\alpha ; \beta]$;
- f est décroissante sur $[\beta ; +\infty [$.

x	$-\infty$	α	β	$+\infty$	
Signe de $f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
Variations de f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$f(\beta)$	0	

3. Expliquer pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

**Corrigé**

Pour tout réel $x \geq 0$:

$$x + 1 > 0 \quad \text{et} \quad x + 2 > 0.$$

Or :

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2).$$

Ainsi :

$$x^2 + 3x + 2 > 0.$$

D'autre part :

$$e^{-x} > 0.$$

Par produit :

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \in [0 ; +\infty[.$$

↵ **Fin du TD** ⇨